

Entresto®
Novartis

Filmdragerad tablett 24 mg/26 mg
(Lila-vit, oval bikonvex filmdragerad tablett med fasade kanter och utan skåra, präglad med "NVR" på den ena sidan och "LZ" på den andra. Ungefärlig tablettstorlek är 13,1 mm x 5,2 mm.)


Angiotensin II-antagonister och neprilysinhämmare

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
Sakubitril
Valsartan

ATC-kod:
C09DX04

Utbytbarhet:
Utbytbara läkemedel

Läkemedel från Novartis omfattas av [Läkemedelsförsäkringen](#).
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se [Förpackningar](#).



M R (F)

[Delbarhetsinformation](#)

Receptbelagd
Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt
[Fråga om läkemedlet](#)

Sök apotek med läkemedlet i lager
[Sök lagerstatus](#)

Är Entresto blodtryckssänkande?

En enkeldos Entresto om 583 mg sakubitril/617 mg valsartan och multipla doser om 437 mg sakubitril/463 mg valsartan (14 dagar) har studerats hos friska frivilliga försökspersoner och tolererades väl. På grund av Entrestos blodtryckssänkande effekt är hypertension det mest troliga symtomet vid en överdosering.^{19 nov. 2}

De vanligaste rapporterade biverkningarna under behandling med Entresto var hypotension, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4). Angioödem har rapporterats hos patienter som behandlats med Entresto (se beskrivning av vissa biverkningar).^{19 nov. 2015}

Forxiga
AstraZeneca

Filmdragerad tablett 10 mg
(Gula, bikonvexa, ungefär 1,1 x 0,8 cm diagonalt rombiska, filmdragerade tabletter med "10" inpräglad på ena sidan och "1428" inpräglad på den andra sidan.)

Natriumglukosamtransportör 2 (SGLT2) hämmare

Aktiv substans:
Dapagliflozin

ATC-kod:
A10BK01

Utbytbarhet:
Utbytbara läkemedel

Läkemedel från AstraZeneca omfattas av [Läkemedelsförsäkringen](#).
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se [Förpackningar](#).



M R (F)

[Delbarhetsinformation](#)

Receptbelagd
Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt
[Fråga om läkemedlet](#)

Sök apotek med läkemedlet i lager
[Sök lagerstatus](#)

Det verksamma ämnet i Forxiga är dapagliflozin vilket är en så kallad SGLT2-hämmare. Hämning av proteinet SGLT2 medför bland annat minskat blodsocker, ökad urinutsöndring, minskat tryck i njurarnas kapillärer, minskad volymöverbelastning på hjärtat och minskat blodtryck.^{24 maj 2023}

När du använder Forxiga kan du uppleva biverkningar. Vanliga biverkningar av läkemedlet är infektion i underliv, ryggsmärtor, yrsel, utslag och ett större behov av att kissa.